

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: [facadm16@gmail.com](mailto:facadm16@gmail.com) to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



# **L'ORGANE DE LA GUSTATION**

Université d'Alger faculté de médecine  
Enseignement d'histologie embryologie  
Préclinique: Dr L.BOUGRINA  
Dr F.Hamoum

# L'ORGANE DE LA GUSTATION

## Généralités

Définition

Répartition

Situation

## Embryologie

## Etude histologique

Etude microscopique

Cytologie

1-Les cellules basales de remplacement

2-Les cellules de soutien (ou cellules sensorielles immatures)

3-Les cellules gustatives (cellules sensorielles matures)

a-En Microscopie Optique

b-En Microscopie Électronique

Origine et évolution des cellules dans le bourgeon du goût

## Innervation des Bourgeons du Goût

1-Distribution et disposition des fibres nerveuses

2-Caractéristiques ultra structurales de la jonction neurosensorielle

3-Les voies gustatives

## Mécanisme cytophysiologique de la gustation

## Généralités

### Definition

Les Bourgeons du Goût sont des petits organes épithéliaux sensoriels spécialisés dans la perception des sensations gustatives : c'est des chémorécepteurs; l'organe de la gustation est un organe des sens secondaires.

### Répartition

Chez les mammifères et notamment chez l'homme les bourgeons du goût siègent:

- Essentiellement dans la cavité bucco-pharyngée: muqueuse l'inguale+++, voile du palais et pharynx+
- Accessoirement sur la partie postérieure des fosses nasales, la partie toute supérieure de larynx, l'épiglotte et l'œsophage

## Situation

Le siège de prédilection est représenté par l'épithélium de la langue, lequel présente: une face dorsale hérissée de quatre types de papilles : **filiformes** (occupant la pointe de la langue), **fungiformes** (reparties en avant du V lingual), **caliciformes** (au nombre de 9 à 11, forment le V lingual) **et foliées** (inconstantes, occupent les bords de la base de la langue).

Les Bourgeons du Goût sont enfouis dans l'épaisseur de l'épithélium de ces papilles et siègent de manière préférentielle :

- Sur les faces latérales et le sommet des papilles fungiformes.
- Au niveau du versant interne du vallum, entourant les papilles caliciformes et rarement sur le versant externe.

## Embryologie

Les Bourgeons du Goût sont d'origine entoblastique: ils se développent à partir de l'épithélium entoblastique recouvrant le champ mésobranchial de His et la région du pharynx.

## Etude histologique



### **Etude microscopique:**

Au Microscope Optique, le Bourgeon du Goût apparait comme une formation arrondie ou ovoïde ( $80\mu$  de hauteur sur  $40\mu$  de diamètre). De structure lamellaire « en bulbe d'oignon », d'aspect clair, contrastant avec le reste de l'épithélium lingual (il ya environ 2000 Bourgeons du Goût chez l'homme).

Son pôle basal est séparé du chorion de la muqueuse linguale par une membrane basale: vitrée.

Son pôle supérieur reste légèrement en retrait par rapport à la surface épithéliale qui est déprimée en fossette dont l'orifice profond porte le nom de pore gustatif.

Les bourgeons du goût contiennent d'abondantes terminaisons nerveuses sensibles et sont par contre dépourvus de capillaires sanguins.





## **Cytologie**

Le Bourgeon du Goût comporte trois variétés de cellules épithéliales:

### **1-Les cellules basales de remplacement :**

Situées à la base du bourgeon du goût, elles ont un rôle dans le renouvellement régulier des cellules du bourgeon du goût (le rythme de renouvellement des cellules du bourgeon du goût est de 10 à 15 jours)

### **2-Les cellules de soutien (ou cellules sensorielles immatures):**

Elles forment la masse des Bourgeons du Goût et se répartissent en:

a.Cellules périphériques dites recouvrantes : les plus nombreuses.

b.Cellules intercalaires: moins abondantes, plus interne que les précédentes.

Elles représentent des cellules épithéliales indifférenciées (immatures) de forme allongée avec une base élargie, un sommet effilé, un cytoplasme pauvre en organites avec un noyau clair de situation variable et de nombreux granules de sécrétion au pôle apical (contenant de la mucine qui sera libérée dans le pore gustatif).


### **3-Les cellules gustatives (cellules sensorielles matures) :**

C'est des cellules épithéliales différenciées elles représentent les cellules sensorielles accessoires, au nombre de 4 à 10 cellules, elles occupent le centre du bourgeon du goût.

#### **a-En Microscopie Optique:**

La cellule gustative offre à décrire :

- Un corps cellulaire : fusiforme dont la partie renflée contient un noyau allongé.
- Un pôle apical : surmonté d'un petit bâtonnet : le bâtonnet gustatif.
- Un pôle basal : bi ou trifurqué reposant sur la vitrée.



## b-En Microscopie électronique:

La cellule gustative offre à décrire :

- Au pôle apical: le bâtonnet gustatif qui apparaît formé d'une dizaine de microvillosités (de 0,1 – 0,2 $\mu$  de largeur sur 2  $\mu$  de long) qui baignent dans le mucus remplissant le pore gustatif. Le cytoplasme de la base de ces microvillosités renferme de nombreuses microvésicules et un matériel filamenteux.
- Au niveau des jonctions neurosensorielles (zone de contact terminaison nerveuse/cellule gustative) le cytoplasme de la cellule gustative renferme une multitudes de microvésicules.
- Sur les faces latérales, présence de nombreux dispositifs d'engrènement et des desmosomes.

La microscopie électronique montre également deux aspects différents de la cellule gustative :

- Cellules d'aspect clair: pauvre en ribosomes et riche en réticulum lisse.
- Cellules d'aspect sombre: riche en ribosomes et comportant un réticulum endoplasmique granulaire très développé.

Ces deux variétés cellulaires correspondent à des stades évolutifs différents d'une même entité cellulaire.

NB: les cellules des Bourgeons du Goût sont en perpétuel renouvellement (la durée de vie d'une cellule est d'environ 10 à 15 jours). Les cellules basales se multiplient s'allonge en périphérie et repousse les cellules les plus anciennes au centre du bourgeon où elles dégénèrent.

## **Origine et évolution des cellules dans le bourgeon du gout**

- A la lumière des nouvelles données, la distinction habituelle des cellules du bourgeon du gout en cellules de soutien (cellules sensorielles immatures) et en cellules gustatives (cellules sensorielles matures) est complètement remise en question par la mise en évidence d'un troisième type cellulaire que sont les cellules basales de remplacement.
- de nombreuses expériences faites chez l'animal montrent que dans le bourgeon du gout l'évolution cellulaire est centripète: les cellules se renouvellent de la périphérie (zone des mitoses) vers le centre (zones de dégénérescences). Au centre du bourgeon du gout se trouve donc des cellules complètement différenciées de courte durée de vie (10h chez le Rat, 30h chez le Lapin).
- Les cellules gustatives (cellules sensorielles matures) de courte durée de vie sont renouvelées en permanence à partir des cellules périphériques plus jeunes (cellules sensorielles immatures), elles même provenant des cellules basales de remplacement; de ce fait les zones synaptiques sont en perpétuel mouvement (c'est des structures dynamiques).

# Innervation des bourgeons du goût :

## **1-Distribution et disposition des fibres nerveuses :**

Les Bourgeons du Goût possèdent une riche innervation provenant du Nerf Glossopharyngien (IX), du Nerf facial (VII) et du vague(X), qui se distribue en trois plexus:

•**Plexus sous épithélial** : constitué par un ensemble hétérogène de fibres nerveuses myélinisées, situées dans le chorion, faite de terminaisons dendritiques provenant des cellules en T du ganglion d'ANDERSCH et d'EHRENITTER, des terminaisons nerveuses de nerf facial et des terminaisons végétatives (X).

•**Plexus périgemmal**: constitué de fibres nerveuses amyéliniques, disposées autour du Bourgeon du goût. ces fibres issues des rameaux du plexus sous épithélial, appartiennent au nerf facial, perdent leurs gaines de SCHWANN et de myéline, traversent la membrane basale et se distribuent autour du bourgeon du gout sans le pénétrer.

•**Plexus intragemmal**:

constitue de de fibres nerveuses amyéliniques d'origine et de nature différentes:

- Les unes représentent des terminaisons nerveuses dendritiques , provenant des cellules unipolaires en T( cellule sensorielle principale), situées au niveau du ganglion d'ANDERSCH et EHRENRIFER pour le nerf glosso-pharyngien (sensibilité de la partie postérieure de la langue : papilles caliciformes); et dont le rôle est capital dans la perception des sensations gustatives .
- Les autres sont d'origine sympathique (végétative), provenant du nerf vague(X), et dont la cellule sensorielle principale est située au niveau du ganglion plexiforme, de rôle indéterminé( Ces fibres sympathiques forment à l'intérieur du bourgeon du gout des dispositifs analogues aux appareils du TIMOFEEV des organes tactiles).

## **2-Caractéristiques ultra structurales de la jonction neurosensorielle:**

Les terminaisons nerveuses sensibles au niveau des zones de jonction neurosensoriels, présentent des extrémités renflées en « massue » dont le neuroplasma renferme :


- \*Un chondriosome plus ou moins abondant.

- \*D'abondantes microvésicules synaptiques (20à40nm de diamètre); contenant de l'acétylcholine.

### **3-Les voies gustatives:**

En partant du **ganglion**, la cellule sensorielle principale (cellule en T, pseudo unipolaire) qui est le premier neurone de la voie gustative, s'articule avec un deuxième neurone situé dans le bulbe cérébral (noyau solitaire). Puis un troisième neurone situé au niveau du thalamus (noyau arqué) lequel parvient au cortex cérébral gustatif (de siège temporal).





# Mécanisme cytophysiologique de la gustation :

Il existe quatre saveurs fondamentales « sucré - salé - acide – amer »; perçues par des régions différentes au niveau de la langue.

Amer : base de la langue (papilles caliciformes).

Sucré : pointe de la langue (papilles fongiformes)

Salé et acide : bords de la langue (papilles fongiformes et foliées).

On distingue schématiquement dans le mécanisme cytophysiologique de la gustation encore hypothétique trois étapes.

-Première étape : Après dissolution dans la salive les substances sapides sont absorbées et fixées sur des sites récepteurs précis, présents à la surface de la membrane plasmique des microvillosités gustatives.

-Deuxième étape : la liaison « substance sapide – site récepteur » déclencherai des réactions enzymatiques, lesquelles entraînent :

- La dépolarisation de la membrane des microvillosités gustatives : point de départ de la stimulation gustative.
- Libération à partir des mitochondries de l'énergie nécessaire à l'excitation de la cellule gustative.

-Troisième étape : propagation de la stimulation sensorielle au niveau de la zone de jonction

« Cellule gustative – terminaison nerveuse » (synapse) par un mécanisme cholinergique.